

SOMMAIRE

MOUBAYED-BREIL, J. & P. LANGTON. [*Polypedilum (Uresipedilum) tissoti* sp. n., une nouvelle espèce connue de tourbières et de prairies humides alcalines situées dans le nord-est de la France (Diptera, Chironomidae, Chironominae)] 1

WAGNER, A., L. VUATAZ & M. SARTORI. *Rhithrogena hercynia* Landa, 1969 et *Rh. grischuna* Sartori & Oswald, 1988, nouvelles pour la faune de France (Ephemeroptera, Heptageniidae)..... 11

ENGBLOM, E. [Contribution à la compréhension du groupe finno-scandinave *Baetis vernus*: *B. subalpinus* et *B. vernus* (Ephemeroptera)]..... 15

DOUCET, G. *Kageronia fuscogrisea* (Retzius, 1783), espèce nouvelle pour le département de la Côte d’Or (Ephemeroptera, Heptageniidae)..... 27

MOUBAYED-BREIL, J. Chironomidae de l’écosystème méditerranéen de France continentale sensu lato. Données faunistiques et biogéographiques sur les quatre dernières décennies [Diptera]..... 31

CONTENTS

MOUBAYED-BREIL, J. & P. LANGTON. *Polypedilum (Uresipedilum) tissoti* sp. n., a new species occurring in alkaline peat bogs and wet sedge meadows in north eastern France (Diptera, Chironomidae, Chironominae)..... 1

WAGNER, A., L. VUATAZ & M. SARTORI. [*Rhithrogena hercynia* Landa, 1969 and *Rh. grischuna* Sartori & Oswald, 1988, two species new for French fauna (Ephemeroptera, Heptageniidae)] 11

ENGBLOM, E. Contribution to the understanding of the Fennoscandian *Baetis vernus* group: *B. subalpinus* and *B. vernus* (Ephemeroptera)..... 15

DOUCET, G. [*Kageronia fuscogrisea* (Retzius, 1783), species new for the French department of Côte d’Or (Ephemeroptera, Heptageniidae)]...... 27

MOUBAYED-BREIL, J. [Chironomidae from the Mediterranean ecosystem of continental France sensu lato. Faunal and biogeographic data over the last four decades (Diptera)]..... 31